



# Aliments complémentaires pour le soutien

## Epato 1500® *Plus*



32 comprimés

1/2 comprimé pour 10 kg de poids corporel  
1 fois par jour

| Poids | 0 - 10 kg | 10-20 kg | 20-30 kg | 30-40 kg | Plus de 40 kg |
|-------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
| Jour  |           |          |          |          |               |

Utilisation recommandée pour une durée de 20-30 jours  
Si nécessaire, la durée peut être prolongée



## Epato 750® *Plus*




30 comprimés

1 comprimé pour 5 kg de poids corporel  
1 fois par jour

| Poids | Moins de 5 kg | Plus de 5 kg |
|-------|---------------|--------------|
| Jour  |               |              |

Utilisation recommandée pour une durée de 20-30 jours  
Si nécessaire, la durée peut être prolongée



## Epato Pâte® *Plus*



2 seringues de 15 ml

1 ml (= 1 encoche) pour 5 kg de poids corporel  
1 fois par jour

| Poids | 0-5 kg | 5-10 kg |
|-------|--------|---------|
| Jour  | 1 ml   | 2 ml    |

Utilisation recommandée pour une durée de 20-30 jours  
Si nécessaire, la durée peut être prolongée



# de la fonction hépatique physiologique

## ACTIFS CLÉS



**Chardon-Marie**, source de **silymarine**, antioxydant aux propriétés hépato-protectrices

- + favorise le renouvellement des cellules hépatiques
- + aide à la détoxification hépatique




**Lécithine** source de phosphatidylcholine, améliore l'absorption de la silymarine



**Oméga 3 (EPA et DHA)** : apaisent et protègent

## Etude clinique

9 chiens présentant des désordres hépatiques reçoivent quotidiennement pendant 1 mois un aliment complémentaire contenant du chardon-Marie



“ Lors d'exposition à un médicament ou supplément hépatotoxique ou de maladie hépatique inflammatoire, la prise d'antioxydants est souvent justifiée en raison de la diminution des mécanismes de défense.

*Selon le consensus de l'ACVIM*

**Epato®** aide à soutenir le **fonctionnement hépatique physiologique** qui peut être altéré en cas de surcharge alimentaire ou hépatique, lors de troubles hépatiques (primaires ou secondaires)...